

Quand faire le recueil ?

- Avant la prise d'antibiotique (sauf avis contraire du médecin),
- De préférence le matin au réveil,
- Avec, si nécessaire, l'aide d'un kinésithérapeute.

Comment faire le prélèvement ?

- Se laver les dents et se rincer la bouche soigneusement avec de l'eau minérale d'une bouteille non entamée (ou de l'eau stérile disponible en pharmacie).
- Recueillir dans le pot stérile les glaires générées au cours d'un effort de toux.



L'expectoration doit venir d'une toux **profonde** :

- **Il ne faut pas recueillir de la salive**
- **Il faut bien se racler la gorge pour cracher des glaires**



Si le prélèvement semble salivaire : → Jeter et recommencer dans un nouveau flacon stérile.

| | Crachat | BK (sans analyse bactériologique) |
|--|---|--|
| Conservation | 2h à température ambiante | A apporter le jour même |
| Heure limite de dépôt | 30 min avant la fermeture en <u>semaine</u> | |
| Heure limite de dépôt le samedi | 11h30 (Exception Site de Levallois : 12h30) | 12h30 |

Nom : **Prénom :** **Né(e) le :**

Date de recueil : **Heure de recueil :**

Traitement antibiotique ? : à débuter en cours aucun terminé le

Nom de l'antibiotique :

A remplir par le laboratoire : Prélèvement réceptionné par le à

Conforme : **Oui**
 Non → dérogation du biologiste ? : Oui Non