



Intérêt : Mettre en évidence les germes responsables d'infection génitale.

Conditions à respecter avant le prélèvement :

- Pas de toilette vaginale interne (« douche vaginale ») depuis 48h.
- Si possible, pas de toilette vaginale externe le jour de l'examen.
- Pas d'application locale de crèmes, gels depuis 24h. Pas d'ovules depuis 48 h et attendre au moins 4 jours pour les ovules à libération prolongée (LP)
- Pas de rapport sexuel depuis 24h.
- Il est conseillé d'éviter le prélèvement pendant la période menstruelle (sauf avis contraire du prescripteur).
- Le prélèvement doit être réalisé **avant** ou **à distance de tout traitement antibiotique :**
 - au moins 5 jours après l'arrêt du traitement pour les germes banals.
 - au moins 6 semaines après l'arrêt du traitement pour les Chlamydiae.

RENSEIGNEMENTS A COMPLETER PAR LA PATIENTE

Nom : Prénom :

Née le :

Renseignements cliniques :

- Douleurs génitales Pertes anormales (abondantes, colorées, odorantes)
- Démangeaisons Brulures mictionnelles Ulcérations / vésicules
- Autre :

Contexte clinique :

- Grossesse (Date de début de grossesse :))
 - Post accouchement (Date de l'accouchement :))
 - Bilan de fertilité Ménopause Stérilet
 - Antibiotique/Antifongique ? : aucun à débiter en cours terminé le
- Nom de l'antibiotique :

Informations sur le partenaire :

Symptômes : non oui ; précisez :

Réservé au laboratoire : Prélèvement effectué par le à

Renseignements complémentaires :