



Intérêt :

Ce test permet de mettre en évidence les œufs d'Oxyures (vers intestinaux), très fréquents chez les enfants et très contagieux, entraînant des démangeaisons et des troubles du sommeil.

Préconisations pour le prélèvement :

A effectuer au lever **avant la toilette** et les premières selles :

- Décoller le scotch de son support.
- Appliquer le coté adhésif sur les plis de la marge anale et le maintenir en appuyant quelques secondes.
- Retirer le scotch et le coller sur la lame support.
- Renouveler l'opération avec le second scotch.
- Replacer les 2 lames dans l'étui.

L'étui doit être acheminé au laboratoire dans la journée.

NB : Seul le scotch TRANSPARENT est utilisable (Pas de scotch dépoli ou opaque !!)



Ce test est facilement réalisable à domicile, mais les biologistes du laboratoire sont disponibles pour le réaliser sur place si les conditions sont remplies (le matin avant la toilette et les premières selles).

RENSEIGNEMENTS A COMPLETER PAR LE PATIENT (ou les parents)

Nom : Prénom : Né(e) le :

Date de recueil : Heure de recueil :

Traitement antiparasitaire : à débiter en cours aucun terminé le

Nom du médicament :

Symptômes : Prurit anal (grattage) Diarrhée Insomnie / enfant irritable

Autre :

A remplir par le laboratoire : Prélèvement réceptionné par le à

Conforme : **Oui**

Non → dérogation du biologiste ? : Oui Non